ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(Ι)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 199 (Έντυπο 12), ημερομηνίας 27/09/2019 για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος μετά την έγκριση όλων των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν και

την επιστολή της εταιρείας για τροποποίηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της οριστικής άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αίτηση με αρ. 606 (έντυπο 09) για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με την εγγυημένη σύνθεση (ήσσονος σημασίας αλλαγής

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FOLICUR 25WG με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας: 2095

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας: 28/04/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας: Θα καθοριστεί μετά τη διαδικασία επανέγκρισης βάσει Άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας) Costas Christodoulou Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς: Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Folicur 25WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: tebuconazole: 25% β/β)
βοηθητικές ουσίες: 73,7% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer AG, Germany

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:
1. Agraform LLC, USA
2. Bayer AG, Germany
3. Exwold Technologies Ltd, United Kingdom
4. Bayer CropScience (China) Co. Ltd. China
5. Bayer CropScience Limited India
6. Kwizda Agro GmbH, Austria
7. Bayer SAS - Division Crop Science, Site de Marle, France
8. SBM Formulation S.A., France
9. Schirm GmbH, Lübeck, Germany
10. Bayer SAS Division Crop Science, Villefranche, France
11.Bayer CropScience LP

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Bayer CropScience S.L., Spain

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα σε κουτί	100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 300 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ. και 1 κιλού	Σακούλα (ες)από σύνθετο υλικό (πολυεστέρας /αλουμίνιο/ πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας), κουτί χάρτινο
2.	Σακούλες σε κουτί	2 x 500 γρ.	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: tebuconazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG, Germany

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Bayer CropScience LP, USA
2. Lanxess Deutschland GmbH, Germany

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Folicur 25 WG είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με πλατύ φάσμα δράσης. Χρησιμοποιείται προφυλακτικά αλλά και θεραπευτικά. Εφαρμόζεται σε ψεκασμούς φυλλώματος. Καταπολεμά ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών όπως Ωίδιο (Στάχτη), Βοτρύτη, Αλτερνάρια, Διδυμέλλα, Κλαδοσπόριο, Σεπτόρια, Σκωρίαση, Μυκοσφαιρέλλα, Φουζικλάδιο, Μονίλια και Σκληρωτίνια.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες [√]

ερασιτέχνες χρήστες [ ]

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλοείδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	**Φουζικλάδιο** *(Venturia inaequalis)*	40	100 – 150	60	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
	Ωίδιο (στάχτη) *(Podosphaera leucotricha)*	50*	150	75		
	Μονίλια *(Monilinia laxa)*	50 – 75*	100 – 150*	75		
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Κερασιά Δαμασκηνιά)	**Φουζικλάδιο** *(Venturia carpophila)*	40	100-150	60		
	Ωίδιο (στάχτη) *(Sphaerotheca pannosa)*	50*	150	75		
	Μονίλια *(Monilinia laxa)*	50 – 75*	100 – 150*	75		
Αμπέλι (Επιτραπέζιες & Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	**Ωίδιο (στάχτη)** *(Uncinula necator)* **Βοτρύτης** *(Botrytis sp.)*	40	100	40		2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθι, Φασόλι, Μπιζέλι	**Ωίδιο (στάχτη)** (*Leveillula taurica, Oidium neolycopersici, Oidium* spp, *Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe* spp.) **Βοτρύτης** (*Botrytis cinerea, Botrytis* sp.) **Αλτερνάρια** (*Alternaria* spp., *Alternaria solani, Alternaria alternata*) **Ανθράκωση** (*Colletotrichum* spp.) **Διδυμέλλα** (*Didymella* sp.) **Μυκοσφαιρέλλα** (*Mycosphaerella* sp.) **Σκωρίαση** (*Uromyces* spp, *Uromyces pisi*) **Σεπτόρια** (*Septoria* spp.) **Σκληρωτίνια** (*Sclerotinia* spp.)	50	100	50	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικές εφαρμογές ή Θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Καρπούζι, Πεπόνι, Φασόλι, Μπιζέλι: 1 εφαρμογή Αγγούρι, Κολοκύθι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες

Η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/δεκάριο.
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αγγούρι, Κολοκύθι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	3 ημέρες
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά), Καρπούζι, Πεπόν	7 ημέρες
Φασόλια, Μπιζέλια	14 ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες)	Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	21 ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	35 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: ---

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Η ανεκτικότητα του από τα φυτά θεωρείται πολύ καλή όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δοσολογίες

10. Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα συνηθισμένα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από τα πολύ αλκαλικά

11. Εικονογράμματα κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS08

GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401 *Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
SP 1 *Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.*

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του εφόσον φυλάγεται σφραγισμένο σε ξηρή και δροσερή αποθήκη

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία 28/04/2022

(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα